¿Quién se la debe realizar?

- Personas mayores a 45 años o menores con atecedentes familiares de CCR.
- Antecedentes de pólipos intestinales.
- Padecer enfermedad inflamatoria intestinal.
- Antecedentes personales de cáncer de mama.

Tú puedes prevenir.

No hay ningún motivo para esperar a presentar síntomas para atenderse, ya que, al esperar puede ser muy tarde.

Factores de riesgo:

- Tener más de 45 años.
- Consumo elevado de carnes rojas o procesadas.
- Dieta baja en fibra, frutas y verduras.
- Sedentarismo.
- Sobrepeso y Obesidad.
- Consumo del alcohol.
- Tabaquismo.
- Pólipos intestinales.
- Enfermedad inflamatoria intestinal.

PREVENCIÓN
ACTITUD ANTE EL
CÁNCER DE
COLON

#ElijoPrevención

Preservando la salud y la calidad de vida de las personas.

Contáctenos para mayor información acerca de la

Prueba OC-Auto FIT-CHEK®
Detección de Sangre Oculta en Heces.

CDMX y Zona Metropolitana
Oficina: +52 (55) 5294 7193
WhatsApp: +52 1 (55) 7381 9171
info@MedPrimex.com

Conoce nuestros productos:

www.MedPrimex.com

CAP ACCREDITED COLLEGE of AMERICAN PATHOLOGISTS
ISO REGISTERED ISO 13485
Cofepris Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

La prueba es fabricada en EE. UU. en un sistema de calidad ISO 13485 en una instalación registrada por la FDA para garantizar la fiabilidad y reproducibilidad.

MedPrimex

fit OC-Auto FIT-CHEK

El cáncer colorrectal es tratable, siempre y cuando se detecte a tiempo.

La prevención es la mejor estrategia para el bienestar.

Nuevo método
NO INVASIVO para
la detección temprana
de cáncer colorrectal.
Práctica. Rápida.
Segura.

El cáncer colorrectal es tratable, siempre y cuando se detecte a tiempo.

Es un método **NO INVASIVO**, sin necesidad de preparación previa, dieta especial, lavado intestinal, ni hospitalización, ya que la muestra se puede tomar en cualquier momento desde la comodidad de su casa.

EL 90% DE LOS CASOS TIENEN CURA, SI SE DETECTA TEMPRANAMENTE.

Signos y síntomas:

- Generalmente aparece en etapas avanzadas.
- Cambios en los hábitos intestinales (diarrea, estreñimiento, delgadez)
- Sangrado, heces oscuras, sangre en heces.
- Cólico abdominal.
- Necesidad de defecar que no desaparece después de hacerlo.

Tecnología que se basa en la detección inmunológica de hemoglobina humana oculta en heces, para la detección oportuna, rápida y económica del CCR, antes de la presentación de síntomas, con la cual disminuye la tasa de mortalidad y además evita la presencia de falsos negativos o positivos.

Dispositivo Recolector
No invasivo



Anatomía
Aparato digestivo inferior

Datos importantes

Es el **3er cáncer más común** en todo el mundo y la 4ta causa más común de muerte. **Es el 4to tipo de cáncer más frecuente en México.**

En México representa la 2da causa de muerte asociada a cáncer. Se origina en el recto o colon, con el crecimiento de un tumor no canceroso.

Esta fase precancerosa es **totalmente asintomática, pero detectable. 90 de cada 100 personas sobreviven** después de haber sido diagnosticados en etapas inicilaes.

70% de los afectados **acude a consulta cuando el mal es irreversible.**